



A toluol

ROSSZ

útra vezet

Mit bámulsz?
Gyere, próbáld ki te is.



Vajon mit csinálnak?





Gyere, szívj bele!

Hmm, ez aztán komoly cucc!



Taknyos, nem kellene az iskolában lenned?

Mi vagyok én, hülyegyerek?

Mennyiért kell?

Ma nem voltál iskolában!

Hmmm

Hallod,
amit mondok?

Ehmm?

Tudod, hogy elveszik a segélyt tőlünk.
És tulajdonképpen hol voltál?

Már nem bírom ki tovább.

Fáj a fejem.

A következő
szünetben
húzóknak innen.

Ha most nem
szólal meg a csengő,
itt halok meg.

Már a tábláig sem
látok el.

Hát itt vagy.
Az edző kérdezte,
hogy mi van veled.

Mi van veled,
neked már
teljesen
átkattant?
Ne szípuzz!

Mi közöd hozzá?

Ásd el magad,
hülyegyerek.

Hé, Miso apja
szerzett egy kocsit.
Este bemegyünk
vele Iglóra.

Velünk jössz?

Ki vagy?

Mit toltál?

Hallasz engem?

Honnan szereztél
ezt az autót?

Nagy bajban vagy,
haver.

A sitten végzed.

Szűcsök, futás.
Jönnek a zsaruk.



A toluol károsítja az agyat és öl

A többi kábítószerhez képest összehasonlíthatatlanul olcsóbb, de a hatása és a használatának a következményei szörnyűek. A toluol szintelen folyadék, festékek vagy lakkok oldására használják. Ez a szer Szlovákia legszegényebb polgárai között terjed. A drog boltokban simán beszerezhető, a függőség nagyon gyorsan kialakul és használata a kezdetektől fogva roncsolja a szervezetet.

A bódulattól a hallucinációig

A toluol belélegzése vagy az úgynevezett szipózás eufóriát, módosult tudatállapotot idéz elő. Először boldogságérzetet, bódulatot, illúziókat és hallucinációt vált ki. Nagyon agresszív drogról van szó, használata testi elváltozásokkal jár:

- ☐ Szívdobogás
- ☐ Izzadás
- ☐ Légzési zavarok
- ☐ Kitágult pupillák
- ☐ Fülzúgás
- ☐ Szédülés
- ☐ A szaglás megváltozása

Az elsősegélynyújtás életment

A toluol belélegzése vagy inhalálása jelentős bonyodalmakat okozhat. A felhasználók gyakran nem képesek felmérni a „biztonságos” belégzés idejét, esetleg erősíteni szeretnék a drog hatását. Eszméletvesztés vagy elégtelen légzés esetén fontos az elsősegélynyújtás. Gyakran megtörténik, hogy a barátok pont ilyenkor megfutamodnak és a sérültet faképnél hagyják. Azonnal biztosítsunk neki friss levegőt, adjunk neki mesterséges légzést, ne hánytassuk és a 155-ös vagy a 112-es számon hívjunk mentőt.

Mellékhatás a halál

A toluol alattomos szer. Más drogokkal ellentétben, amelyek fokozatosan rombolják a szervezetet, a toluol már az első használatától kezdve visszafordíthatatlan károsodásokat okoz. Leginkább a szívet károsítja, halálos kimenetelű szívritmuszavarokat okozhat. A vegyszerek fulladást okozhatnak, gyakoriak a marási sérülések a bőrön, a szájüregben, az orr nyálkahártyáján és az emésztőszerveken.

A toluol pusztítóan hat az agyra. Szipuzása

emlékezetkiesést, beszédzavart okoz és az idegrendszer visszafordíthatatlan károsodását idézi elő. A toluol szó szerint „kiradírozza” az agyat. A toluol rendszeres használata tartósan lerontja az agyműködést, lerombolja a személyiséget, demenciát is okozhat. A toluolt ezért is nevezik a „hülyék drogjának”. Károsítja a vesét, az immunrendszert és módosítja a vér összetételét. Fejfájást és izombántalmakat okoz, remegést és epileptikus rohamot vált ki.